

¿QUÉ ES EL PARVOVIRUS CANINO?

El parvovirus canino es una enfermedad viral muy contagiosa que, aunque también puede afectar a los gatos domésticos, es mucho más común en perros, especialmente en cachorros de al menos cuatro semanas de edad o en perros adultos con sistemas inmunes debilitados que no han sido vacunados contra este virus.

Este virus ataca las células del cuerpo del perro, afectando gravemente su sistema digestivo. En cachorros infectados, el virus puede dañar el músculo cardíaco, generando problemas del corazón que pueden persistir de por vida.

Síntomas:

- Letargo
- Vómitos intensos
- Falta de apetito
- Diarrea con presencia de sangre

Causas:

El parvovirus es altamente contagioso y puede transmitirse a través del contacto con las heces de un perro infectado, afectando a personas, animales o cualquier objeto expuesto.

Este virus puede sobrevivir durante meses en superficies, como comederos, ropa, zapatos o el suelo.

Los perros que no han recibido la vacuna contra el parvovirus, especialmente los cachorros, son muy vulnerables a esta infección. Razas como los rottweiler, doberman, labrador, staffordshire americano y pastor alemán son particularmente propensas a este virus.

La prevención más efectiva es la vacunación y mantener los espacios donde habitan las mascotas limpios, ya que esta enfermedad no tiene un tratamiento específico y suele requerir hospitalización.